

## بررسی اثرات نوسان شبهدوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی

زینب سیفی<sup>۱</sup>، سید مجید میرکنی<sup>۲</sup>، محمد جفتایی<sup>۳</sup>، علیرضا محب‌الحجه<sup>۴</sup>

<sup>۱</sup>زینب سیفی، دانشگاه یزد، [z.seifi\\_2014@yahoo.com](mailto:z.seifi_2014@yahoo.com)

<sup>۲</sup>سید مجید میرکنی، دانشگاه یزد، [mirrokni@yazd.ac.ir](mailto:mirrokni@yazd.ac.ir)

<sup>۳</sup>محمد جفتایی، دانشگاه یزد، [mjoghataei@yazd.ac.ir](mailto:mjoghataei@yazd.ac.ir)

<sup>۴</sup>علیرضا محب‌الحجه، دانشگاه تهران، [amoheb@ut.ac.ir](mailto:amoheb@ut.ac.ir)

### چکیده

فعالیت امواج سیاره‌ای در پوشن‌سپهر و نحوه برهم‌کش آنها با نوسان‌هایی QBO و تاوه قطبی، درانتقال و وردن‌پذیری سال به سال اوزن پوشن‌سپهر موثر است. در پژوهش حاضر، با استفاده از تاوایی‌پتانسیل روى سطوح همدماي پتانسیلی در فازهای مختلف QBO رسم شد. نتایج نشان می‌دهد، کشیدگی‌های تاوایی پتانسیلی به سمت مسیر طوفان‌های اطلس، آرام و مدیترانه است. کشیدگی و پریشیدگی روی این سطوح، در ترازهای واقع در پوشن‌سپهر میانی به‌علت فعالیت کمتر امواج نسبت به پوشن‌سپهر پایینی کمتر است. همچنین تاوه در فاز غربی قوی‌تر از فاز شرقی است. گرادیان نصفالنهاری تاوایی پتانسیلی تفاوت بارزی بین فازهای مختلف QBO دارد. این گرادیان منطقه شکست امواج و لبه تاوه قطبی را نشان می‌دهد. نتیجه این که در هر دو فاز نوسان، لبه جنب‌حاره‌ای تاوه قطبی در پوشن‌سپهر زیرین قوی‌تر است در حالی‌که در پوشن‌سپهر میانی لبه قطبی تاوه قطبی قوی‌تر می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** امواج سیاره‌ای، پوشن‌سپهر، تاوه قطبی، نوسان شبهدوسالان، تاوایی پتانسیلی، فعالیت موجی

## Impact of the Quasi-Biennial Oscillation (QBO) on the Polar Vortex in the lowermost and middle stratosphere in Early Winter

<sup>1</sup>Zeynab Sayfi, Yazd University

<sup>2</sup>Seyed Majid Mirrokni, Yazd University

<sup>3</sup>Mohammad Joghatei, Yazd University

<sup>4</sup>Alireza Mohebalhojeh, Theran University

### Abstract

QBO is one of the most important oscillations in the Stratosphere. Study of the oscillation is important because of extratropical effects of QBO and interaction between stratosphere and troposphere. Role of planetary wave activity in interaction between QBO and polar vortex is very important. Extratropical impacts of this oscillation on polar vortex especially on level of lowermost and middle stratosphere is considered in early winter. Using NCEP NCAR reanalysis data to compute potential vorticity on potential temperature levels in different phases of QBO is examined. Potential vorticity is depicted on potential temperature 380 and 480 levels as lowermost stratospheric levels, and 500 and 580 levels as middle stratospheric levels. Results show that elongation of potential vorticity on these levels toward the Atlantic, Pacific and Mediterranean storm tracks. Vorticity in westerly phase is more stronger than easterly phase of QBO. Polar vortex edge and surf zone are appeared on these levels and hasmeaningful difference in easterly and westerly phase of QBO. Subtropical edge of polar vortex is stronger in lowermost stratosphere while polar edge of vortex is stronger in middle stratosphere.

**Keywords:** planetary waves, Stratosphere, polar vortex, QBO, potential vorticity, wave activity

### ۱ مقدمه

نوسان شبهدوسالانه (QBO) با میانگین دوره تناوب ۲۹-۲۸ ماه می‌باشد که در پوشن‌سپهر میانی تا پایینی با سرعت ۱ کیلومتر در ماه (بالدوین-دانکرتون ۱۹۹۸) به صورت عمودی (به سمت پایین) انتشار می‌یابد. نوسان QBO از دو گروه موج شرق-سو (گرانی، گرانی-لختی، کلوین) و غرب-سو (گرانی راسپی) ایجاد می‌شود (لیندزن و هلتون، ۱۹۶۸) و در طی فاز منفی (شرقی) تسريع می‌شود و باعث فراوانی وقایع گرمایش در پوشن‌سپهر می‌شود.

نوسان QBO منطقه حاره، نقش مهمی در تغییرات آب‌وهوازی مناطق برون‌حاره دارد (هلتون و تن، ۱۹۸۰). که به طور محلی و به‌واسطه گسترش قائم و بالاًسوى امواج استوازی پدید می‌آید. دامنه این امواج حاره‌ای پس از ورود به پوشن‌سپهر با توجه نوع موج در پوشن‌سپهر زیرین یا زیرین شکسته می‌شوند.


قانون بقای تکانه زاویه‌ای ایجاد می‌کند که انرژی تکانه‌زاویه‌ای امواج پس از شکسته شدن به پوشش سپهر منتقل شود. بدین ترتیب شکست امواجی با تکانه شرق سو موجب ایجاد فاز غربی QBO و شکست امواجی با تکانه غرب سو موجب ایجاد فاز شرقی QBO می‌شود (شفرد، ۲۰۰۰).

اسبقی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود نشان داد که تاوه قطبیدر فاز غربی QBO قوی‌تر از فاز شرقی است. جرم محصور در لوله‌های تاوه در فاز غربی بیشتر از فاز شرقی است. همین طور نشان دارد که امواج راسی بیشتر در لبه‌های تاوه شکسته می‌شود و به همین دلیل تاوه قطبی ضعیفتر است. هنوز اثرات برون‌حارة‌ای این نوسان کاملاً شناخته شده نیست. مثلاً رفتار تاوه قطبی در فازهای مختلف این فاز دقیق شناخته شده نیست یا برهمکنش موج و شارش میانگین را در فازهای مختلف این نوسان را نمی‌دانیم. از نظر اثرات این نوسان بر وضع هوای آب‌وهوای منطقه ما نیز جای پژوهش بسیار زیادی وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی اثرات برون‌حارة‌ای این نوسان بهویژه روی رفتار تاوه قطبی روی ترازهای دمایی واقع در پوشش سپهر زیرین و میانی است. بهمنظور بررسی این اثرات بعد از گرفتن داده‌های سرعت مداری، فازهای مختلف QBO را جدا کرده و پس از دسته‌بندی داده‌ها در مرحله اول اثر QBO روی تاوه قطبی (در برون‌حارة‌ای) بررسی می‌شود. در مرحله دوم نقشه‌های تاوابی پتانسیل روی سطوح همدماهی پتانسیلی در فازهای مختلف QBO رسم می‌شود.

## ۲ روش تحقیق

فازهای شرقی و غربی با استفاده از داده‌هایی که از (Freie Universität Berlin (FUB) (برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به [www.fu-berlin.de/en/](http://www.fu-berlin.de/en/)) استخراج شده بود تفکیک شد. که علامت میانگین مداری باد مداری (ممولا در تراز ۵۰۰ هکتوپاسگال) مشخص‌کننده فازها است. میانگین مداری باد مداری با علامت مثبت فاز شرقی و علامت منفی فاز غربی است. از این داده‌ها برای دسته‌بندی داده‌ای NCEP-NCAR، استفاده شده است. سرعت افقی، سرعت قائم و دما روی سیزده تراز دمایی (۳۴۰، ۳۶۰، ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۴۴۰، ۴۶۰، ۴۸۰، ۵۰۰، ۵۲۰، ۵۴۰، ۵۶۰، ۵۸۰) استخراج شد و سپس تاوابی پتانسیلی روی این ترازها محاسبه شد. با استفاده از نقشه‌های تاوابی پتانسیل، تغییرات تاوه قطبی بررسی شد. نتایج تاوابی پتانسیلی روی ترازهای ۳۸۰ و ۴۸۰ به عنوان پوشش سپهر زیرین و ترازهای (۵۰۰ و ۵۸۰) به عنوان پوشش سپهر میانی نمایش داده شده است.



شکل ۱. نقشه تاوابی پتانسیل برای ترازهای دمایی پتانسیل ۵۰۰ و ۵۸۰ کلوین، ردیف بالا فاز غربی، ردیف وسط فاز شرقی و ردیف پایین اختلاف فاز شرقی از غربی.

## ۳ نتیجه‌گیری

نمایش تاوابی پتانسیل روی سطوح همدماهی پتانسیل کمک بسزایی در شناخت دینامیک جو دارد. با توجه به این که در غیاب فرآیندهای دررو، حرکت بسته هوا بین ترازهای دمایی پتانسیلی محدود می‌شود؛ پس نمایش تاوابی پتانسیلی روی ترازهای دمایی پتانسیل، دیدگاه خوبی از دینامیک وضع هوای ساختارهای آب و هوایی می‌دهد.

تاوایی پتانسیل را برای ترازهای دمایی پتانسیل  $380^{\circ}\text{C}$  نمایش داده شد که در تراز  $380^{\circ}\text{C}$  شکل تاوه مرکزی نسبت به تراز  $480^{\circ}\text{C}$  هم در فاز شرقی و هم غربی واضح‌تر است. همچنین در این تراز کشیدگی به سمت مسیر طوفان اطلس، آرام و مدیترانه دیده می‌شود. این کشیدگی‌ها در ترازهای بالاتر که ترازهای پوشن‌سپهر میانی محسوب می‌شوند، کمتر شده است و عدد موج از سه به دو کاهش پیدا کرده است. در این ماه تاوه در فاز غربی هم از نظر شدت و هم گستردگی قوی‌تر از فاز شرقی است. کاهش گرادیان در لبه تاوه نشان می‌دهد که شکست امواج در ترازهای بالاتر کمتر از ترازهای پایین تر است، زیرا شکست امواج با گرادیان تاوایی پتانسیل نسبت عکس دارد.

گستردگی تاوه در این ماه نسبت به ماه نومبر بیشتر است. (به دلیل محدودیت تعداد صفحات نقشه‌های تاوایی پتانسیل برای ماه نومبر از مقاله حذف شد). درنقشه‌های تفاضلی در تراز  $380^{\circ}\text{C}$  یک مرکز مثبت و منفی در عرض‌های میانه دیده می‌شود. در تراز  $480^{\circ}\text{C}$  نیز یک کمربند مثبت در قطب، یک کمربند منفی در عرض‌های میانه و یک کمربند مثبت در جنب‌حاره در حال شکل‌گیری است که در تراز  $500^{\circ}\text{C}$  کامل‌تر شده است.

نمودار توزیع نصف‌النهاری تاوایی پتانسیل را برای تراز دمایی  $360^{\circ}\text{C}$ ,  $380^{\circ}\text{C}$ ,  $480^{\circ}\text{C}$ ,  $500^{\circ}\text{C}$  و  $580^{\circ}\text{C}$  در عرض صفر تا  $90^{\circ}$  درجه شمالی نمایش داده شد. بیشینه و کمینه‌هایی در نمودار دیده شد در تراز  $380^{\circ}\text{C}$  بیشینه این تغییرات در عرض جغرافیایی حدود  $35^{\circ}$  درجه است. از آنجایی که به صورت بصری و شهودی، لبه قطبی و لبه جنب‌حاره‌ای تاوه قطبی و منطقه شکست امواج در نمودارهای فازهای شرقی و غربی کمتر مشخص است، نمودارها را برای تفاضل فاز شرقی از غربی ارائه شد. نمودار تغییرات تفاضل تاوایی پتانسیل به ترتیب برای ترازهای  $500^{\circ}\text{C}$  و  $480^{\circ}\text{C}$  کلوینی نمایش داده شد که بیشینه تغییرات در در عرض‌های بالاتر حدود  $70^{\circ}$  درجه شمالی دیده شد. توزیع نصف‌النهاری تاوایی پتانسیلی برای تفاضل فاز شرقی از غربی تاوایی پتانسیل را در ترازهای  $360^{\circ}\text{C}$ ,  $380^{\circ}\text{C}$ ,  $480^{\circ}\text{C}$ ,  $500^{\circ}\text{C}$  و  $580^{\circ}\text{C}$  دمای کلوین نمایش داده شد. در نمودار نوسانی این تغییرات، بیشینه تغییرات در عرض حدود  $32^{\circ}$  درجه دیده شد.

توزیع نصف‌النهاری تفاضل تاوایی در دو فاز نوسان را به ترتیب برای ترازهای دمایی  $580^{\circ}\text{C}$  و  $560^{\circ}\text{C}$  نمایش داده شد که بیشینه تغییرات در قطب و موقعیت جت شبائۀ قطبی دیده شد. در همه نمودارها دو بیشینه دیده شد که یکی منطبق بر لبه جنب‌حاره‌ای تاوه قطبی است و دومی منطبق بر لبه قطبی تاوه قطبی است. همچنین در شکل رابطه عکس بین گرادیان نصف‌النهاری تاوه پتانسیلی و شکست امواج را که از خصوصیات جو نتیجه می‌شود دیده شد. قسمتی از نمودار که بین دو بیشینه قرار گرفته است، نیز منطبق بر محل شکست امواج است. نمایش تاوایی پتانسیلی روی ترازهای پایین ( $380^{\circ}\text{C}$  دمایی) که در پوشن‌سپهر پایینی قرار دارد سه کشیدگی به سمت اقیانوس اطلس، آرام و مدیترانه را نشان می‌دهد که همان مسیر طوفان‌ها هستند. این کشیدگی‌ها به سمت ترازهای بالاتر ( $500^{\circ}\text{C}$  و  $580^{\circ}\text{C}$ ) کمتر شده است. این ترازها در پوشن‌سپهر میانی قرار دارند. در پوشن‌سپهر انتقال انرژی فقط در مقیاس بزرگ است و جو در این لایه ساکن است و فعالیت امواج سیاره‌ای اینجا مطرح است کمتر شدن کشیدگی‌ها شکست کمتر امواج در این ترازها به این علت است که برخی امواج (امواج گذر) که بالای وردسپهر شکسته می‌شوند و از ورداشت عبور نمی‌کنند. تاثیر این امواج در ترازهای پایینی بیشتر دیده می‌شود. برخی دیگر از امواج که از پوشن‌سپهر میانی می‌توانند عبور کنند همان امواج سیاره‌ای هستند که کشیدگی را سبب می‌شوند. به همین علت در ترازهای پایین‌تر کشیدگی بیشتر و عدد موج بیشتر از ترازهای بالاتر دیده می‌شود.

## منابع

- Mark p .Baldwin and Timothy .Dunkerton ,(1998), Binennial,quasi-biennial ,and decadal oscillations of potentiale vorticity in the northenrn stratosphere .journal of geophysical research , **103** , 4, 3919-3928.
- قربان اسبقی و همکاران (۱۳۹۳)، "بررسی اثر نوسان شبه دو سالانه بر تاوه قطبی در ابتدای زمستان" ، "مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران" ، ۲۳-۲۵ اردیبهشت ، ۳۶۲-۳۶۶.
- Holton, J. R., and H. C. Tan, 1980: The influence of the equatorial quasi-biennial oscillation on the global circulation at 50 mb. J. Atmos. Sci., **37**, 2200– 2208.
- Shepherd,T.G.,2002,Issues in stratosphere-troposphere coupling, J. Met. Soc. Japan, 80, 4B, 769-792.